

DESCRIPTION

Cilny™ is a preparation of Cilnidipine. Cilnidipine is a novel dihydropyridine calcium antagonist and its calcium antagonistic activity is longer lasting than those of Nifedipine and Nicardipine. Cilnidipine has been used for the treatment of hypertension and hypertensive-associated vascular disorders. Cilnidipine has a very low solubility (BCS Class-II drug Low solubility high permeability) .

INDICATIONS

Hypertension Management for End Organ Protection

DOSAGE AND ADMINISTRATION

The recommended adult oral dosage of Cilnidipine is 5-10 mg once daily. The dosage can be increased up to 20 mg, if needed.

CONTRAINDICATIONS

Hypersensitivity to Cilnidipine or any other component of this product

SIDE EFFECTS

- Dizziness • Flushing • Headache • Hypotension • Peripheral oedema
- Tachycardia • Palpitations • GI disturbances • Increased micturition frequency
- Lethargy

PRECAUTION AND WARNING

Cilnidipine should be administered with care in the following patients:

1. Patients with serious hepatic dysfunction
 2. Patients with a serious adverse reaction to calcium antagonists
- During discontinuation, the dose should be gradually decreased under close observation.

USE IN PREGNANCY AND LACTATION

Cilnidipine should not be administered in pregnant women or women having possibilities of being pregnant. It is also admissible to avoid the administration of Cilnidipine to nursing mother. However, if the administration is indispensable, the patient should be instructed to discontinue lactation.

DRUG INTERACTIONS

Cilnidipine can interact with aldeseleukin, quinidine, phenytoin, rifampicin, erythromycin, other anti-hypertensive drugs and anti-psychotic drugs.

PHARMACEUTICAL PRECAUTION

Do not store above 30 °C temperature. Keep away from light and wet place. Keep out of reach of children.

PACKAGING

Cilny™ 5 Tablet: Box containing 3 strips of 10 tablets each. Each film coated tablet contains Cilnidipine INN 5 mg.

Cilny™ 10 Tablet: Box containing 3 strips of 10 tablets each. Each film coated tablet contains Cilnidipine INN 10 mg.

SK•F

Manufactured by

ESKAYEF PHARMACEUTICALS LTD.

TONGI, GAZIPUR, BANGLADESH

TM TRADEMARK

PM08329 V01

সিলনিডিপিন আই.এন.এন. পাতলা আবরণযুক্ত ট্যাবলেট

বর্ণনা

সিলনি™ হল সিলনিডিপিন এর একটি প্রস্তুতি। সিলনিডিপিন হল একটি অভিনব ডাইহাইড্রোপাইরিডিন ক্যালসিয়াম অ্যান্টাগোনিষ্ট এবং এর ক্যালসিয়াম বিরোধী কার্যকলাপ নিক্বেডিপাইন এবং নিকার্ডিপাইন এর চেয়ে দীর্ঘস্থায়ী। সিলনিডিপিন উচ্চ রক্তচাপ এবং উচ্চ রক্তচাপ-জনিত ভাস্কুলার ব্যাধিগুলির চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত হয়। সিলনিডিপিন এর দ্রবণীয়তা কম (বিসিএস ক্লাস-II) ড্রাগ কম দ্রবণীয় ও উচ্চ ব্যাধিযোগ্য)।

নির্দেশনা

উচ্চ রক্তচাপ জনিত ভাস্কুলার ব্যাধিগুলির প্রতিরোধে উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ।

সেবনমাত্রা ও সেবনবিধি

প্রাণ্ডবয়স্কদের জন্য সিলনিডিপিন এর প্রস্তাবিত মৌখিক ডোজ ৫-১০ মিলিগ্রাম দিনে একবার। প্রয়োজনে ডোজ ২০ মিলিগ্রাম পর্যন্ত বাড়ানো যেতে পারে।

প্রতিনির্দেশনা

সিলনিডিপিন বা এর অন্য কোন উপাদান এর প্রতি সংবেদনশীলতা।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া

- মাথা ঘোরা • ফ্লাশিং • মাথাব্যথা • নিম্ন রক্তচাপ • পেরিফেরাল ইডেমা • টেকিকার্ডিয়া • বুক ধড়ফড় করা • পরিপাক তন্ত্রের সমস্যা • ঘনঘন প্রস্রাব হওয়া • ক্লান্তি

সাবধানতা ও সতর্কতা

নিম্নোক্ত রোগীদের ক্ষেত্রে সিলনিডিপিন সতর্কতার সাথে ব্যবহার করতে হবে।

১. যাদের যকৃত মারাত্মকভাবে অকার্যকর

২. যাদের ক্যালসিয়াম অ্যান্টাগোনিষ্ট গ্রহণের ফলে পূর্বে তীব্র পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হয়েছে।

সিলনিডিপিন সেবন বন্ধ করার সময় মাত্রা ধীরে ধীরে গভীর পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে কমিয়ে আনতে হবে।

গর্ভাবস্থা এবং স্তন্যদানকালে ব্যবহার

গর্ভাবস্থায় অথবা যাদের গর্ভধারণের সম্ভাবনা রয়েছে তাদের সিলনিডিপিন গ্রহণ করা উচিত নয়। স্তন্যদানকারী মায়েরদের ক্ষেত্রে সিলনিডিপিন সেবন করা উচিত নয়। যদি গুণ্ড গ্রহণ অপরিহার্য হয়, রোগীকে স্তন্যদান থেকে বিরত থাকতে হবে।

অন্য গুণ্ডের সাথে প্রতিক্রিয়া

সিলনিডিপিন অ্যালডেসলেউকিন, কুইনাইডিন, ফিনাইটোয়িন, রিফামপিসিন, এরিস্থ্রোমাইসিন, অন্যান্য অ্যান্টি-হাইপারটেনসিভ গুণ্ড এবং অ্যান্টি-সাইকোটিক গুণ্ডের সাথে প্রতিক্রিয়া করতে পারে।

সংরক্ষণ

আলো ও অর্দ্রতা থেকে দূরে, ৩০ °সে. তাপমাত্রার নিচে রাখুন। শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন।

সরবরাহ

সিলনি™ ৫ ট্যাবলেট:

প্রতি বক্সে ১০ টি ট্যাবলেটের ৩ টি স্ট্রিপ রয়েছে। প্রতিটি পাতলা আবরণযুক্ত ট্যাবলেটে আছে সিলনিডিপিন আই.এন.এন. ৫ মি.গ্রা.।

সিলনি™ ১০ ট্যাবলেট:

প্রতি বক্সে ১০ টি ট্যাবলেটের ৩ টি স্ট্রিপ রয়েছে। প্রতিটি পাতলা আবরণযুক্ত ট্যাবলেটে আছে সিলনিডিপিন আই.এন.এন. ১০ মি.গ্রা.।

SK•F

প্রস্তুতকারক

এসকেএফ ফার্মাসিউটিক্যালস্ লি:

টঙ্গী, গাজীপুর, বাংলাদেশ

TM ট্রেডমার্ক