

Mycofin®

Terbinafine Hydrochloride BP 1% Spray

DESCRIPTION

Mycofin® is a preparation of Terbinafine Hydrochloride which is a synthetic allylamine derivative reported to have a broad spectrum of antifungal activity. It is considered to act through inhibition of fungal ergosterol biosynthesis. **Mycofin®** is fungicidal against dermatophytes and some yeasts, molds and fungi.

INDICATIONS

Mycofin® is indicated for the treatment of fungal infections of the skin caused by dermatophytes such as trichophyton and pityriasis (tinea) versicolor due to Malassezia furfur.

DOSAGE AND ADMINISTRATION

Terbinafine spray is applied once or twice daily, depending on the indication.

- Interdigital Tinea pedis: Once a day for 1 week
- Tinea corporis, cruris: Once a day for 1 week
- Pityriasis versicolor: Twice a day for 1 week
- Relief of clinical symptoms usually occurs within a few days.
- Irregular use on premature discontinuation of treatment carries the risk of recurrence.

CONTRAINDICATIONS

Mycofin® is contraindicated in patients with known hypersensitivity to terbinafine or any of its excipients.

SIDE EFFECTS

Pruritis, skin lesion, skin exfoliation, application site pain, irritation, pigmentation disorder, skin burning sensation, erythema, scab, eczema, dermatitis contact.

PRECAUTIONS

- **Mycofin®** spray should be used with caution in patients with lesions where alcohol could be irritating. It should not be used on the face.
- **Mycofin®** spray is for external use only. It may be irritating to the eyes. Contact with the eyes should be avoided.
- In case of accidental inhalation, consult a physician if any symptoms develop or persist.

USE IN PREGNANCY AND LACTATION

- Pregnancy: Although animal studies show no fetal toxicity, there is no information on possible adverse effects in human and it should not be given to pregnant women.
- Nursing Mothers: Since the drug is excreted in breast milk, it should not be given to the nursing mothers.
- Children: Not recommended.

DRUG INTERACTION

None

PHARMACEUTICAL PRECAUTION

Do not store above 30 °C temperature. Keep away from light and wet place. Keep out of reach of children.

PACKAGING

Mycofin® Spray:

Each bottle contains 30 mL solution. Each gram spray contains Terbinafine Hydrochloride BP 10 mg.

SK+F

Manufactured by

ESKAYEF PHARMACEUTICALS LTD.

MIRPUR, DHAKA, BANGLADESH

© REGD. TRADEMARK

M/P01493 V01

মাইকোফিন®

টারবিনাফিন হাইড্রোক্লোরাইড বি.পি. ১% স্প্রে

বর্ণনা

মাইকোফিন® টারবিনাফিন হাইড্রোক্লোরাইডের প্রস্তুতি যা একটি সিঙ্গেটিক অ্যালাইলএমিনের ডেরিভেটিভ যার ব্রড-স্পেকট্রাম অ্যান্টিফাংগাল রিপোর্ট পাওয়া গেছে। এটি ফাংগাসের এরগোস্টেরল জৈব সংশ্লেষণ বাধার মাধ্যমে কাজ করে। **মাইকোফিন®** ডার্মাটোফাইট এবং কিছু ইস্ট, মোল্ড এবং ফাংগাসের বিরুদ্ধে কার্যকরী।

নির্দেশনা

মাইকোফিন® ত্বকের ফাংগাল সংক্রমণে নির্দেশিত যা ডার্মাটোফাইট (ট্রাইকোফাইটন) দ্বারা হয়ে থাকে। এছাড়াও ম্যালাসেজিয়া ফারফার নামক ছত্রাক দ্বারা সৃষ্ট পিটাইরিয়াসিস ভারসিকালার চিকিৎসায় নির্দেশিত।

মাত্রা ও প্রয়োগবিধি

নির্দেশনার ভিত্তিতে টারবিনাফিন স্প্রে দিনে একবার বা দুবার ব্যবহার করতে হবে।

- ইন্টারডিজিটাল টিনিয়া পেডিস: দিনে একবার করে ১ সপ্তাহের জন্য
- টিনিয়া কর্পোরিস, ক্রুরিস: দিনে একবার করে ১ সপ্তাহের জন্য
- পিটাইরিয়াসিস ভারসিকালার: দিনে দুইবার করে ১ সপ্তাহের জন্য
- ক্লিনিকাল লক্ষণগুলির উপশম সাধারণত কয়েক দিনের মধ্যে হয়ে থাকে।

অনিয়মিত ব্যবহার বা সময়ের আগে চিকিৎসা বন্ধ করলে পুনরায় ইনফেকশন হওয়ার ঝুঁকি থাকে।

প্রতিনির্দেশনা

টারবিনাফিন অথবা এর কোনো উপাদানের প্রতি অতিসংবেদনশীলতা আছে এমন রোগীদের ক্ষেত্রে **মাইকোফিন®** ব্যবহার করা যাবে না।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া

প্রুইটিস, ত্বকের ক্ষত, ত্বকের এক্সফোলিয়েশন, ব্যবহারের জায়গায় ব্যথা, জ্বালা, পিগমেন্টেশন ডিসঅর্ডার, ত্বকে জ্বালাপোড়া, ত্বকে লালভাব, ক্ষাব, একজিমা, ডার্মাটাইটিস।

সতর্কতা

- টারবিনাফিন স্প্রে ক্ষতসহ রোগীদের ক্ষেত্রে সতর্কতার সাথে ব্যবহার করা উচিত যেখানে অ্যালকোহল ব্যবহারে জ্বালাপোড়া হতে পারে। এটি মুখে ব্যবহার করা উচিত নয়।
- টারবিনাফিন স্প্রে শুধুমাত্র বাহ্যিক ব্যবহারের জন্য। এতে চোখে জ্বালা হতে পারে। চোখে ব্যবহার এড়ানো উচিত।
- দুর্ঘটনাজনিতভাবে শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে চলে গেলে, যদি কোন লক্ষণ দেখা দেয় তবে একজন চিকিৎসকের সাথে পরামর্শ করুন।

গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার

- গর্ভাবস্থা: যদিও প্রাণীর গবেষণায় জন্মের টার্সিসিটি দেখা যায় না, তবে মানুষের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে কোনও তথ্য নেই এবং এটি গর্ভবতী মহিলাদের দেওয়া উচিত নয়।
- স্তন্যদানকারী মা: যেহেতু ওষুধটি বুকের দুধে নির্গত হয়, তাই এটি স্তন্যদানকারী মায়েরদে দেওয়া উচিত নয়।
- শিশু: দেওয়া উচিত নয়।

ওষুধের মিথস্ক্রিয়া

নেই।

সংরক্ষণ

৩০ °সে. তাপমাত্রার উপরে সংরক্ষণ করা যাবে না। আলো ও আর্দ্রতা থেকে দূরে রাখুন।

শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন।

সরবরাহ

মাইকোফিন® স্প্রে:

প্রতিটি বোতলে আছে ৩০ মি.লি. সলিউশন। প্রতি গ্রাম স্প্রে-তে রয়েছে টারবিনাফিন হাইড্রোক্লোরাইড বি.পি. ১০ মি.গ্রা.।

SK+F

প্রস্তুতকারক

এসকেএফ ফার্মাসিউটিক্যালস্ লি.

মিরপুর, ঢাকা, বাংলাদেশ

© রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক